

# Die Schulterlagen

in der geburtshülflichen Klinik und Poliklinik  
in Greifswald,

während der Zeit vom 1. Januar 1878 bis 1. Januar 1892.

## Inaugural - Dissertation

zur

Erlangung der Doctorwürde

in der

Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe,

welche

nebst beigefügten Thesen

mit Zustimmung der Hohen Medicinischen Facultät  
der Königlichen Universität zu Greifswald

am

Sonnabend, den 24. September 1892

Mittags 1 Uhr

öffentlich verteidigen wird

**Hermann Schultz**

aus Demmin.

Opponenten:

cand. med. Krahn,

„ „ Steffen.

---

Greifswald.

Druck von Julius Abel.

1892.



Digitized by the Internet Archive  
in 2026

Seinen teuren Eltern

in Liebe und Dankbarkeit

gewidmet

vom

Verfasser.

Eines der häufigsten und praktisch wichtigsten Geburtshindernisse wird durch die Querlage bedingt, eine Lage, in der eine ausgetragene und lebende Frucht nicht durch das kleine Becken hindurchgehen kann, die also für die Naturkräfte unvollendbar ist. So kann denn auch von einem eigentlichen Geburtsmechanismus bei diesen pathologischen Lagen nicht die Rede sein, abgesehen von den Fällen der Selbstentwicklung und der Geburt *conduplicato corpore*, die jedoch nur bei unreifen oder wenn ausgetragenen, so doch toten Kindern zur Wahrnehmung gelangen können. Stören nun diese Lagen einerseits den Geburtsverlauf an sich so, dass für gewöhnlich Kunsthülfe nötig ist, so gefährden sie andererseits auch das Leben der Mutter sowohl wie das des Kindes, wenn auch im Vergleich zu früher der Procentsatz der Todesfälle sich bedeutend verringert hat. Und worin liegt die Hauptgefahr bei diesen Lagen und die Vermeidung derselben in unsrer Zeit? Der Hinweis auf den durch die Antisepsis und Asepsis erfolgten Umschwung reicht nicht aus. Hier fällt noch eine andere Errungenschaft ins Gewicht. Früher, wo die Querlagen von den Hebammen meist erst nach gesprungener Blase und völlig erweitertem Muttermund erkannt wurden und der Arzt dann zu spät kam, blieb ihm im günstigsten Falle die Wendung übrig, während jetzt bei Verbesserung des Hebammenunterrichts der frühzeitig gerufene Arzt durch einfachere Eingriffe die Lage verbessern oder doch, wenn dies nicht gelingt, persönlich

den Fortgang der Geburt überwachen kann, um zu rechter Zeit mit der Kunsthülfe einzuschreiten. So geht ihm der günstigste Augenblick zum Handeln, der des Blasensprungs, mit dem erst die eigentliche Gefahr der Querlagen einsetzt, nicht verloren, wenn nicht etwa vorher schon Complicationen sein Eingreifen erheischten. Jedenfalls ist die Prognose besser geworden und wird stetig sich günstiger gestalten.

Bevor ich nun auf die bei der Behandlung der Querlagen anwendbaren Methoden eingehe, muss ich noch auf die Aetiologie der Querlagen hier im allgemeinen mein Augenmerk richten, wenn auch bei jedem einzelnen der in dieser Arbeit zusammengestellten Fälle die Aetiologie, so weit sie sich eruieren liess, ihren Platz finden wird. Betrachten wir zunächst den Procentsatz von Querlagen unter der Geburt und während der Schwangerschaft, so fällt uns sofort auf, dass wir, je weniger weit die Schwangerschaft vorgerückt ist, um so häufiger auf Querlagen stossen. Und worin liegt dies begründet? Da im allgemeinen die Lage des Kindes eine Folge der Wirkung der Schwerkraft ist und diese in den verschiedenen Lagen der Schwangeren in verschiedener Richtung wirkt, so wird auch in der ersten Zeit der Schwangerschaft der Foetus um so öfter seine Lage wechseln, da die Schlaffheit der Wände des Uterus ihm eine grössere Bewegungsexkursion gestattet. Der Kopf wird häufig vom Beckeneingang seitlich abweichen und bei Seitenlage wird sich dann verhältnismässig leicht eine reine Querlage herstellen, da ein fester Widerstand von Seiten des Uterus diesem Lagewechsel nicht entgegengesetzt wird.

Diese Möglichkeit der freieren Bewegung des Kindes im Uterus wird uns auch bei den Ursachen für die Querlagen unter der Geburt wieder begegnen.

Werden nämlich im Verlauf der Schwangerschaft die

Uteruswände straffer und halten diese nun die Frucht so in ihrer Lage, dass ein Wechsel nicht so leicht möglich ist, wie dies vor allen bei Primiparen eintritt, so wirkt dies mit dem Gesetz der Schwerkraft zusammen dahin, dass die Mehrzahl der Kinder in Kopflage, oder doch wenigstens in einer Geradlage zur Geburt kommt. Bei Mehrgebärenden dagegen tritt uns dieser Einfluss nicht so exakt entgegen, weil bei ihnen die Wandungen des Uterus schlaffer sind. Es liegt bei ihnen der Kopf noch kurz vor Eintritt der Geburt beweglich über dem Beckeneingang oder etwas nach einer Seite abgewichen. Meist wird nun auch hier durch die Contractionen eine Geradlage herbeigeführt. Jedoch kommt es gerade bei Mehrgebärenden, wenn die Abweichung des Kopfes etwas bedeutender war, leicht zur Querlage.

So lehren uns diese Betrachtungen eine Ursache für das häufigere Vorkommen von Querlagen bei Mehrgebärenden erkennen, der sich später noch andere anreihen werden.

Verlassen wir nun die aus der Schwangerschaft mit auf das Kreissbett übernommenen Querlagen und wenden uns den unter der Geburt entstandenen zu. Aus dem regelmässigen Befunde bei Erstgebärenden, dass der Kopf schon am Ende der Schwangerschaft im Beckeneingang steht, werden wir schon den Schluss ziehen können, dass zum Zustandekommen von Querlagen bei ihnen anormale Verhältnisse im Spiele sein müssen. Üben diese ihre Wirkung derart aus, dass der Kopf beweglich über dem Beckeneingang steht oder zum seitlichen Abweichen gebracht wird, so gestaltet sich die Lage ähnlich der bei Mehrgebärenden vorhandenen. Dieser Zustand bei Erstgebärenden nun wird bei weitem am häufigsten durch Beckenenge veranlasst, so dass Querlagen bei ihnen schon den Verdacht auf Beckenfehler erwecken müssen.

Der Kopf weicht hierbei vom Beckeneingang ab, weil

derselbe für ihn zu klein ist, und so entwickelt sich in Folge der Contractionen eine Schulterlage. Was berechtigt uns nun, aus Querlagen bei Erstgebärenden die Wahrscheinlichkeits-Diagnose auf fehlerhaftes Becken zu stellen, während uns bei Mehrgebärenden diese Annahme nicht sofort geboten erscheint? Die vorangegangenen Geburten haben eben bei Mehrgebärenden Verhältnisse hinterlassen, die leichter Querlagen zustande kommen lassen. Da ist vor allem die Schlaffheit des Uterus zu beschuldigen. Das Kind findet hier ebenso wie in der ersten Zeit der Schwangerschaft von Seiten des Uterus keinen festen Widerstand.

Ist nun diese Erschlaffung des Uterus bei Mehrgebärenden überhaupt nicht selten, so tritt sie in besonders hohem Grade auf nach vorausgegangenen schweren Geburten bei engem Becken. Eben dieser Grund der Beweglichkeit der Frucht ist auch die Ursache der Querlagen bei Hydramnion, bei ganz kleinen Früchten und bei Zwillingsgeburten. Beim Hängebauch liegt der Grund etwas anders. Hier fällt der Fundus uteri stark nach vorn und infolgedessen weicht der Kopf leicht vom Becken ab.

Auch rein mechanische Hindernisse können das Einstellen des sonst regelrecht vorliegenden Kopfes verhindern, so placenta praevia und im Beckeneingang liegende Tumoren.

Einzelne dieser Complicationen kommen zwar auch bei Erstgebärenden vor, jedoch in so seltenen Fällen, dass enges Becken die Hauptätiologie bei ihnen bleibt.

Ist nun der Kopf abgewichen, so wirken noch besondere Umstände mit, um die für gewöhnlich noch eintretende Correction der Lage zu verhindern.

Vor allem kommt hier der plötzliche Abfluss des Fruchtwassers in Betracht. Hierdurch wird die Frucht in

der Lage fixiert, in der sie sich gerade befand, bevor eigentlich Wehen sie in eine Gradlage verwandeln konnten.

Ferner wird, wie bei dem Wechsel der Lage in der Schwangerschaft, auch hier die Lage der Mutter eine Rolle spielen. So ist es erklärlich, dass, gleichwie eine falsche Lage der Schwangeren eine Querlage, so auch bei der Therapie eine richtige Lagerung zu rechter Zeit wiederum die Correction herbeiführen kann.

Betrachten wir nun den Verlauf der Querlagen! Bei Blasensprung fließt alles Fruchtwasser ab, infolgedessen sich die Uteruswände eng an die Frucht anlegen. Hierbei ist nun das Kind nicht gefährdet, weil die Zusammenziehung des Uterus nur eine passive ist. Wird jedoch jetzt nicht eingeschritten und die Lage verbessert, so wird durch die auftretenden Contractionen fast stets die eine Schulter tiefer ins Becken getrieben. Auch die Haltung der Frucht wird leicht verändert, so dass Arm- und Nabelschnurvorfälle häufige Complicationen sind, die jedoch ohne Bedeutung sind. Weist zwar oft der Armvorfall darauf hin, dass die Wendung wegen des Tiefstandes der Schulter eine schwierige wird, so hat man doch andererseits im Anschlingen des Armes eine Erleichterung beim eventuellen Lösen der Arme. Aus der vorgefallenen Nabelschnurschlinge andererseits erwächst durchaus keine Gefahr und Störung, weil eine Compression derselben nicht zu befürchten ist und die Reposition, weil zwecklos, nicht gemacht wird. Die Querlage wird also erst gefährlich nach Blasensprung. Denn während vor demselben die Wehen nur die Erweiterung des Muttermundes beförderten, bewirken sie jetzt eine starke Ausziehung des unteren Uterinsegmentes, da sie die Schulter nicht durch das Becken zu treiben vermögen. So erfordert jede Querlage ein Einschreiten seitens des Arztes, da sie, sich selbst überlassen, den Tod herbeiführt an Ruptura uteri, Blutungen, Erschöpfung, entzündlichen Prozessen oder

ähnlichen Erkrankungen der Mutter. In gleichem Masse wird dieselbe jedoch durch unzweckmässige Manipulationen während der passiven Zusammenziehung des Uterus gefährdet. Es werden hierdurch tetanische Contractionen hervorgerufen und das Kind stirbt an Asphyxie. Ruptur tritt hierbei selten ein, da die Wehenthätigkeit zwar anhaltend, aber nicht stark ist. Viel gefährlicher für die Mutter ist die Sepsis.

Der im gegebenen Falle nötige und zweckmässigste Eingriff richtet sich darnach, wie weit die vorliegende Querlage ausgebildet und vorgeschritten ist. So kommen die äusseren Handgriffe nur in Betracht, so lange die Blase noch steht. Kommt man zu einem Falle, wo der Kopf seitlich abgewichen ist und noch leicht beweglich über dem Beckeneingang steht, so wird man zunächst durch Lagerung der Kreissenden die Stellung zu corrigieren versuchen. Jedoch darf man nicht glauben, wenn wirklich die Einstellung gelingt, seine Schuldigkeit gethan zu haben und nun befriedigt von dannen gehen zu dürfen. Ebenso leicht wie die Verbesserung der Lage gelingt, kann sie wieder verloren gehen. Darum bleibt eine stete Überwachung nötig, bis die Wehen den Kopf völlig fixieren, während im anderen Falle ein weiteres Vorgehen nötig wird. Auch von der Wendung auf den Kopf darf man sich, wenn sie während der Schwangerschaft vorgenommen wird, keinen grossen Vorteil versprechen, da die Veränderlichkeit der Kindeslage eine bedeutende zu sein pflegt. Günstiger liegen die Verhältnisse im Beginn der Geburt, wo die Wehen den einmal vorliegenden Kopf zu fixieren vermögen. Steht die Blase noch und ist der Muttermund noch nicht erweitert, so ist die Wendung auf den Kopf zu versuchen. Falsch würde man handeln, wollte man in der Voraussetzung, dass bis zum Blasensprung keine Gefahr vorhanden ist, von jedem Versuche abstehen und abwarten, bis der Muttermund

verstrichen wäre, um dann nach Sprengen der Blase die Wendung auf den Fuss vorzunehmen. Man kommt eben häufig mit der Wendung auf den Kopf zum Ziele und tauscht so eine schonende Operation gegen eine eingreifendere ein. Contraindication gegen Wendung auf den Kopf könnte enges Becken geben, obgleich bei mässig verengtem Becken der Kopf Zeit genug hat, sich dem Beckeneingang zu accomodieren, und placenta praevia, wo die Wendung auf den Fuss vorzuziehen ist. Von dem Versuche, nach gelungener Wendung auf den Kopf die Blase zu sprengen, um hierdurch das Einstellen des Kopfes und den Verlauf der Geburt in Schädellage zu sichern, ist im allgemeinen abzuraten, da man sich der Gefahr aussetzt, dass die Wehen aufhören oder nicht genügend wirken, und man gezwungen wird, bei nicht erweitertem Muttermund zu operieren.

Von der Wendung auf den Kopf wird man ferner absehen müssen, trotz der leichten Möglichkeit derselben, wenn die sofortige Entbindung erforderlich ist. Man würde durch diese Wendung jedes Mittels zur Extraction verlustig gehen, da die Zange wegen des hohen Standes des Kopfes nicht möglich ist.

In solchen Fällen bleibt nur die Wendung auf den Fuss übrig und haben wir zu unterscheiden zwischen combinierter Wendung und Wendung mit ganzer oder halber Hand. Die Entscheidung, welche von beiden man wählen muss, richtet sich nach dem Verhalten des Muttermundes. Ist derselbe nur für 1—2 Finger durchgängig, so wird die kombinierte Wendung gemacht. Man versucht vorher, ob derselbe nicht mechanisch dilatierbar ist und wenn die supravaginale Partie des Cervix verstrichen ist, kann es unter Umständen empfehlenswert sein, die blutige Erweiterung vorzunehmen. Ist der Muttermund erweitert, so macht man die Wendung mit ganzer Hand. Mit der Wendung ist der Hauptzweck des Einschreitens, die Correction der Lage,

erreicht. Um jedoch für das Leben des Kindes bessere Chancen zu gewinnen, ist man bisweilen gezwungen, die Extraction folgen zu lassen, wenn der Mutter keine Gefahr daraus erwächst, und es wird deshalb bei jedem der zusammengestellten Fälle von Querlage, wo die Extraction nötig war, auch dieser Erwähnung gethan werden.

Gelingt die Wendung selbst nach mehreren Versuchen nicht, so ist man oft im Interesse der Mutter gezwungen, die Zerstückelung des Kindes vorzunehmen, und man wird sich hierzu um so leichter entschliessen, als das Leben des Kindes dann meist schon in Frage gestellt ist.

Einige Beispiele mögen uns das oben Zusammenge stellte veranschaulichen, und werde ich dazu die in den geburtshülflichen Journalen der Greifswalder Klinik und Poliklinik vom 1. Januar 1878 bis 1. August 1892 verzeichneten 122 Fälle von Querlagen benutzen. Die Aufzählung erfolgt nach den einzelnen Methoden der Behandlung.

# I. Wendung auf dem Kopf durch äussere Handgriffe.

| Nummer.                      | Körper- und Beckenverhältnisse. | Wieviel Gebärend.                                | Lage der Frucht.             | Bei wie grossem Muttermund floss das Wasser ab?                                                                                                                                                                                                             | Besondere Umstände.      | Zustand des Kindes vor und während der Operation. | Erfolg<br>a.<br>für die Mutter.<br>b.<br>für das Kind. |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. Frau Z.,<br>26 Jahre alt. | V                               | I. Schulterlage, 2. Abteilung.                   | —                            | Wehen gut.                                                                                                                                                                                                                                                  | Foetalspuls regelmässig. | Günstiger Verlauf des Wochenbetts.                | lebt.                                                  |
| 2. Frau K.,<br>27 Jahre alt. | III para                        | II. Schulterlage. Geburt in I, Schädel-<br>lage. | Muttermund völlig erweitert. | Lagerung auf rechte Seite hatte keinen Erfolg. Wendung gelingt durch äussere Handgriffe bei stehender Blase und 5-markstückgrossen Muttermund. Bei völlig erweitertem Muttermund wird die Blase gesprengt und der Kopf in den Beckeneingang hineingedrückt. | Foetalspuls regelmässig. | Wochenbett normal.                                | stirbt am 10. Tage.                                    |
| 3. Frau H.,<br>35 Jahre alt. | VII para                        | II. Schulterlage.                                | —                            | —                                                                                                                                                                                                                                                           | gut.                     | günstig.                                          | lebt.                                                  |

## II. Combinierte Wendung.

| Nummer.                     | Körper- und Beckenverhältnisse. | Wie viel gebährend. | Lage der Frucht.               | Bei wie grossem Muttermund floss das Wasser ab? | Besondere Umstände.                                                                                        | Zustand des Kindes vor und während der Operation. | Erfolg<br>a. für die Mutter.<br>b. für das Kind.  |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. Frau D., 32 Jahre alt.   |                                 | II para             | I. Schulterlage, 2. Abteiling. | Vorzeitiger Abfluss des Fruchtwassers           | Frühgeburt im 9. Monat. Placenta praevia lateralis. Blutungen. Tamponade u. Placenta manuell entfernt.     | Foetalspuls gut.                                  | Erkrankt an Endometritis, diphtheritica, Heilung. |
| 2. Frau D., 32 Jahre alt.   |                                 | VI para             | —                              | Muttermund 3-markstückgross.                    | Placenta praevia. Blutungen.                                                                               | gut.                                              | normal.<br>nicht lebensfähig.                     |
| 3. Frau Sch., 25 Jahre alt. |                                 | III para            | I. Schulterlage, 1. Abteiling. | —                                               | —                                                                                                          | gut.                                              | günstig.<br>lebt.                                 |
| 4. Frau F., 38 Jahre alt.   |                                 | VI para             | I. Schulterlage, 1. Abteiling. | Muttermund 3-markstückgross.                    | Das Wasser war 2 Stunden vor Eintreffen des Arztes abgeflossen. Wendung bei 5-markstückgrossen Muttermund. | —                                                 | günstig.<br>lebt.                                 |
| 5. Frau Sch., 34 Jahre alt. |                                 | VII para            | II. Schulterlage,              | Muttermund 3-markstück-                         | Placenta praevia. Starke Blutungen Linker Fuss                                                             | —                                                 | Wochenbett normal.<br>tot.                        |

|                                                                                                                          |          |                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                |                                                                |                                                                               |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 6. Frau H.,<br>24 Jahre alt.                                                                                             | —        | 1. Abteiling.<br>II. Schulterlage,<br>2. Abteiling. | gross.<br>Dickwandig.<br>Fruchtwasser ist 6 Stunden vor der Operation abgeflossen.<br>Fruchtwasser ist vor 2 Stunden abgeflossen. | heruntergeholt. Extraction.<br>Muttermund ist bei der Wendung 5-markstückgross, etwas dehnbar. | gut.                                                           | günstig.                                                                      | Fractura humeri. heilt.   |
| 7. Frau B.,<br>36 Jahre alt.                                                                                             | —        | I. Schulterlage,<br>2. Abteiling.                   | Muttermund 5-markstückgross. Linker Ellenbogen und Nabelschnur pulsirt regelmäßig. Wendung erfolgt auf beide Füße.                | Vorliegen der Nabelschnur.                                                                     | normal.                                                        | lebt.                                                                         |                           |
| 8. Anna G.,<br>Spin. 22 $\frac{1}{2}$ .<br>Crist 25 $\frac{1}{2}$ .<br>Conjug. extern. 19 $\frac{1}{2}$ .                | III para | I. Schulterlage,<br>2. Abteiling.                   | Muttermund 5-markstückgross.                                                                                                      | —                                                                                              | —                                                              | günstig.                                                                      | lebt.                     |
| 9. Frau D.,<br>45 Jahre alt.<br>Frühere Geburten leicht. Sp. 24, Cr. 28, Conjug. extern. 19 $\frac{1}{2}$ .<br>Diag. 11. | XI para  | I. Schulterlage.                                    | Bei 3-markstückgrossen Muttermund.                                                                                                | Zwei Stunden nach Blasensprung ist der Muttermund 5-markstückgross. Extraction.                | Während der Operation wird die Reaction auf Kitzeln schwächer. | Anfangs Atonie des Uterus.                                                    | lebt.                     |
| 10. Frau L.,<br>31 Jahre alt.<br>Bei einer Geburt war Kunst-<br>hilfe nötig.                                             | VI para  | I. Schulterlage,<br>1. Abteiling.                   | 5-markstückgrosser Muttermund.                                                                                                    | Placenta praevia.                                                                              | —                                                              | Anfangs hohe Temperatur. Keine Empfindlichkeit des Bauches. Gesund entlassen. | Stirbt an Lebensschwäche. |

## Combinirte Wendung.

| Nummer.                                             | Körper- und Beckenverhältnisse. | Wie viel gebährend. | Lage der Frucht.                 | Bei wie grossem Muttermunde floss das Wasser ab? | Besondere Umstände.                                                                                                                   | Zustand des Kindes vor und während der Operation.          | Erfolg<br>a. für die Mutter.<br>b. für das Kind.                                                |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. Frau R., 42 Jahre alt. Einn. Wendung.           |                                 | XV para             | II. Schülterlage, 1. Abtheilung. | Blase schon seit längerer Zeit gesprungen.       | Die Frau kommt kreisend in die Klinik, Ein- führen der recht. Hand wird etwas bei 3-markstückgrossen Muttermund. Wendung. Extraction. | Der Foetalpuls unregelmässig. Die Reflexe werden schwächer | Wochenbett normal. lebt.                                                                        |
| 12. Frau L., 31 Jahre alt. Plattes Becken.          |                                 | II para             | II. Schülterlage, 2. Abtheilung. | Blase springt bei 3 markstückgrossen Muttermund. | Die Frau kommt kreisend in die Klinik. Placenta manuell entfernt.                                                                     | —                                                          | Starke Blutungen nach der Geburt. Sonst normal. Fractura claviculae und femoris dextr. Heilung. |
| 13. Auguste G., 39 Jahre alt. Starke Beckenneigung. |                                 | VII para            | —                                | Bei 3-markstückgrossen Muttermund.               | Wendung und Extraction.                                                                                                               | Die Reflexe verschwinden.                                  | günstig. Tief asphyktisch, wieder belebt.                                                       |

## III. Wendung.

| 1. Johanna Sch.,<br>25 Jahre alt.                                                                                                                                                         | III<br>para | I. Schulter-<br>lage.<br>2. Abteil. | Muttermund<br>handteller-<br>gross.                           | Fruchtwasser 3 Stunden<br>vor gänzlich erweiter-<br>tem Muttermund abge-<br>flossen. Linke Hand an-<br>geschlungen. Extract. | Reflexe<br>ver-<br>schwin-<br>den.         | günstig. | Kind asphyk-<br>tisch. Nach<br>$\frac{1}{2}$ -ständigen<br>Bemühungen<br>wieder belebt.<br>Clavic. Fract.<br>geheilt.<br>leicht<br>asphyktisch. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Frau L., 39 Jahre<br>alt, 2 Zangen-<br>geburten mit töd-<br>lichem Ausgang.<br>1 Wendung. Sp.<br>$24\frac{1}{2}$ Cr. 26. Conj.<br>ext. $17\frac{3}{4}$ Conj.<br>diag. $9\frac{1}{2}$ . | IV<br>para  | I. Schulter-<br>lage.<br>2. Abteil. | Künstlicher<br>Blasensprung<br>bei saumartig.<br>Muttermunde. | Extraction.                                                                                                                  | Schwinden<br>der<br>Reflexe.               | gesund.  | leicht<br>asphyktisch.                                                                                                                          |
| 3. Emilie St., 38 J.<br>alt. Sp. 20. Cr.<br>$24\frac{1}{2}$ Conj. ext.<br>$18\frac{1}{2}$ .                                                                                               | III<br>para | Kopf links<br>abge-<br>wichen       | —                                                             | Anschlingen des linken<br>Armes. Nabelschnur um<br>den Hals geschlungen.                                                     | —                                          | normal.  | leicht<br>asphyktisch.                                                                                                                          |
| 4. Frau N., 42 Jahre<br>alt. Frühere Ge-<br>burten schwer.<br>(Zange. Wendung<br>Perforation).<br>Sp. $23\frac{1}{2}$ Cr. 27.<br>Conj. ext. $16\frac{1}{2}$<br>Diag. 10.                  | VII<br>para | I. Schulter-<br>lage.<br>1. Abteil. | verstrichen.                                                  | linker Arm vorgefallen.<br>Angeschlungen.                                                                                    | —                                          | —        | —                                                                                                                                               |
| 5. Elisabeth B., 39<br>Jahre alt. Bauch<br>stark aufgetrieb.                                                                                                                              | II<br>para  | II. Schul-<br>terlage.              | verstrichen.                                                  | Zwillinge. Das erste<br>Kind in I. Schädellage.<br>Beim zweiten Wendung.<br>Extraction.                                      | Kind<br>reagiert<br>schlecht<br>auf Reize. | günstig. | lebt                                                                                                                                            |

## Wendung.

| Nummer. | Körper- und Beckenverhältnisse. | Wie viel Gebärend. | Lage der Frucht.                          | Bei wie grossem Muttermunde floss das Wasser ab? | Besondere Umstände.                                                                                                    | Zustand des Kindes vor und während der Operation. | Erfolg                                  |                                   |
|---------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
|         |                                 |                    |                                           |                                                  |                                                                                                                        |                                                   | a. für die Mutter.                      | b. für das Kind.                  |
| 6.      | Frau Sch., 31 Jahre alt.        | VII para           | II. Schulterlage. 2. Abteil.              | völlig erweitert.                                | Frau kommt kreissend in die Klinik. Extract. Nabelschnur 3 mal um den Hals geschlungen.                                | faulrot.                                          | Atonie. Hefige Blutungen. Sonst normal. | tot.                              |
| 7.      | Bertha Br., 24 Jahre alt.       | III para           | Kopf nach links abgewichen.               | verstrichen.                                     | Rechter Arm vorgefallen. Nabelschnurvorfall. Expression.                                                               | —                                                 | gut.                                    | lebt.                             |
| 8.      | Friederike K., 36 Jahre alt.    | IX para            | I. in Iiter Schädel-<br>II. Schulterlage. | handteller-<br>gross.                            | Zwillinge. Placenta praevia. Frau kommt kreissend in d. Klinik. Auch das erste Kind wird gewendet wegen der Blutungen. | Foetalspuls regelmässig.                          | gut.                                    | Beide Kinder leben.               |
| 9.      | Frau B., 21 Jahre alt.          | II para            | —                                         | fast verstrichen.                                | Placenta praevia. Starke Blutungen. Extraction.                                                                        | Frühgeb. Mitte d. 8. Monats.                      | gesund.                                 | tot.                              |
| 10.     | Marie Dr., 29 Jahre alt.        | II para            | II. Schulterlage. I. Abteil.              | verstrichen.                                     | Linker Arm ist schwer zu lösen.                                                                                        | —                                                 | günstig.                                | Fractura humeri sinistri geheilt. |
| 11.     | Lina M., 26 Jahre               | IV                 | I. Schulter-                              | völlig er-                                       | —                                                                                                                      | —                                                 | gut.                                    | lebt.                             |

| alt.                                                                                                   | para       | lage.<br>I. Abteil.                  | weitert.                                          | Bei Blasensprung fällt Kind nicht<br>der rechte Arm vor, ausgetrag.<br>Kopf mit Zange ent-<br>wickelt.                                                           | normal.                                            | stirbt. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|
| 12. Wilhelmine H.,<br>27 Jahre alt. Sp.<br>21. Cr. 23. Conj.<br>exter. 18. Dia-<br>gon 11.             | II<br>para | II. Schul-<br>terlage.<br>I. Abteil. | —                                                 |                                                                                                                                                                  |                                                    |         |
| 13. Frau St., 35 Jahre<br>alt. Conj. vera<br>7 $\frac{1}{2}$ —8 cm.                                    | —          | I. Schulter-<br>lage.<br>I. Abteil.  | Wasser floss<br>am Abend vor<br>der Geburt<br>ab. | Beide Arme vorgefallen.<br>Contractionsring 7 cm<br>über der Symphyse.<br>Extraction. Die Mutter<br>kommt mit 120 Puls-<br>schlägen in die Klinik.<br>Erbrechen. | Exitus letalis<br>am 6. Tage.                      | tot.    |
| 14. Bertha M.,<br>25 Jahre alt.                                                                        | IV<br>para | II. Schul-<br>terlage.<br>2. Abteil. | —                                                 | Nabelschnurvorf. In<br>der Scheide liegt der<br>stark geschwollene<br>rechte Arm.                                                                                | Kleiner<br>Dammriss.<br>(1 Nadel)<br>sonst gesund. | tot.    |
| 15. Johanna Sch.,<br>28 Jahre alt.<br>1 Wendung früh.<br>Bauchbruch.                                   | IV<br>para | I. Schulter-<br>lage.<br>I. Abteil.  | handteller-<br>gross.                             | Nabelschnur vorgefallen. Anfangs<br>Placenta praevia. Ex-regelmäss.<br>traction. Placenta ma-<br>nuell entfernt.                                                 | günstig.                                           | lebt.   |
| 16. Friederike H.,<br>28 Jahre alt.<br>Sp. 24. Cr. 27.<br>Conj. exter. 20.<br>Diag. 11 $\frac{1}{2}$ . | II<br>para | II. Schul-<br>terlage.<br>I. Abteil. | verstrichen.                                      | Beide Arme vorliegend.                                                                                                                                           | gesund.                                            | lebt.   |

## III. Wendung.

| Nummer. | Körper- und Beckenverhältnisse.                                     | Wie viel Gebärend. | Lage der Frucht.             | Bei wie grossem Muttermund floss das Wasser ab? | Besondere Umstände.                                                                                                                      | Zustand des Kindes vor und während der Operation. | Erfolg                            |                                    |
|---------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|         |                                                                     |                    |                              |                                                 |                                                                                                                                          |                                                   | a. für die Mutter.                | b. für das Kind.                   |
| 17.     | Frau A., 39 Jahre alt. Von den früheren Geburten 3 Aborte, 1 Zange. | XI para            | —                            | —                                               | Die Frau kommt kreisend in die Klinik. Das Fruchtwasser ist schon abgeflossen. Der Muttermund ist fast verstrichen. Frühgeburt. Wendung. | —                                                 | Mutter stirbt an Carcinoma recti. | Kind stirbt an Lebensschwäche.     |
| 18.     | Berta L., 18 Jahre alt.                                             | II para            | II. Schultertage, 2. Abteil. | Handteller-gross.                               | Frühgeburt im 9. Monat.                                                                                                                  | —                                                 | gut.                              | stirbt.                            |
| 19.     | Marie Dr., 59 Jahre alt. 1 Wendung früher. Becken normal.           | III para           | II. Schultertage, 1. Abteil. | Handteller-gross.                               | Die rechte Hand fällt vor. Der Contractionsring ziemlich hoch. Der Kopf lag neben dem Steiss. Wendung.                                   | abgestorben.                                      | gut.                              | tot.                               |
| 20.     | Emilie K., 39 Jahre alt.                                            | XV para            | I. Schultertage, 1. Abteil.  | Verstrichen.                                    | Wendung. Extraction.                                                                                                                     | Foetalspuls regelmässig.                          | normal.                           | leicht asphyktisch. Wieder belebt. |
| 21.     | Marie M., 25 Jahre alt. Sp. 27. Cr. 30. Conj. ext. 20. Bauchumfang  | II para            | I. Schultertage, 2. Abteil.  | Künstlicher Blasensprung bei fast verstrichenem | Viel Fruchtwasser. Der linke Arm liegt vor. Frühgeburt im 9. Monat. Kind sehr klein, wiegt                                               | Foetalspuls regelmässig.                          | günstig.                          | stirbt nach 1 1/2 Stunden.         |

|     |                                                                                                 |             |                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22. | Wilhelmine K.,<br>starke Becken-<br>neigung. Becken-<br>masse normal.                           | III<br>para | I. Schul-<br>terlage.<br>2. Abteil.  | Muttermund.<br><br>Nicht völlig<br>erweitert. | 2200 gr und 43 cm lang.<br>Respiration der Mutter<br>wegen Ausdehnung des<br>Abdomens sehr er-<br>schwert.<br>Durch Lagerung wurde<br>die abgewichene Kopf-<br>lage nicht corrigiert. Es<br>bildet sich vollkommene<br>Schulterlage aus. Wen-<br>dung. Extraction. Der<br>Rücken bleibt nach<br>hinten, da der obere<br>Fuss nicht zu fassen<br>war und mithin auf den<br>unteren die Wendung<br>gemacht werden musste.<br>Wendung. Extraction. | — | normal.                                                                                                                                                       | stirbt nach<br>2 Tagen an<br>Atrophie.                                                                                                                                                                              |
| 23. | Frau Bl.                                                                                        | —           | II. Schul-<br>terlage.<br>1. Abteil. | —                                             | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — | Total. Damm-<br>riss. Mast-<br>darmaht heilt<br>vollständig.<br>Die Scheiden-<br>naht garnicht.<br>Die Damm-<br>naht wenig —<br>Blasenkatarrh<br>— geh. entl. | Fractura hu-<br>meri sinistri.<br>Epiphysen-<br>trennung des<br>recht. Humerus<br>— u. der linken<br>Tibia. Heilung<br>— Pemphigus<br>heilt bei Calo-<br>mel ziemlich<br>aus.<br>Fractura clavi-<br>culae. Geheilt. |
| 24. | Wilhelmine B., 26<br>Jahre alt. Hänge-<br>bauch. Sp. 26 1/2.<br>Cr. 29. Conj.<br>exter. 17 1/2. | II<br>para  | II. Schul-<br>terlage.<br>2. Abteil. | —                                             | Grosse Menge Frucht-<br>wasser. Oberer (linker).<br>Fuss heruntergeholt.<br>Der Rücken kommt nach<br>vorn. Extraction.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — | günstig.                                                                                                                                                      | —                                                                                                                                                                                                                   |

## III. Wendung.

| Nummer. | Körper- und Beckenverhältnisse.                 | Wie viel gebärend. | Lage der Frucht.                | Bei wie grossem Muttermunde floss das Wasser ab? | Besondere Umstände.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zustand des Kindes vor und während der Operation.                                     | Erfolg                   |
|---------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 25.     | Frau B., 33 Jahre alt. Abdomen sehr ausgedehnt. | VI para            | II. Schult. verlage. 2. Abteil. | —                                                | Viel Fruchtwasser. Die Wendung war von einem gestorbenen, anderen Arzt versucht ohne Erfolg. Die Frau kommt kreissend in die Klinik. Der rechte Arm ödematös vorliegend. Wendung mit rechter Hand gelingt. Geringe Wehentätigkeit mit grossen Pausen. Kind wiegt 3690 gr und 53 cm lang. | Die ab- gestorben. nerin erkrankt an Puerperalfieber. Wird als Reconvalescentin entl. | tot.                     |
| 26.     | Frau L., 40 Jahre alt.                          | VI para            | I. Schult. verlage.             | —                                                | Schulterlage, hervorgegangen aus I. Gesichtslage. Das Gesicht nach 8. Monat. links abgewichen, so dass Arm und Rippen im Muttermunde liegen. Wendung u. Extraction.                                                                                                                      | Frühgeburt im 8. Monat. normal.                                                       | tot.                     |
| 27.     | Frau Br., 32 Jahre alt. Starke Rechts-          | —                  | II. Schult. verlage.            | Fruchtwasser seit 6 Stunden                      | Arm vorgefallen und an-Foetalpuls geschlungen, jedoch von regel-                                                                                                                                                                                                                         | günstig.                                                                              | Leicht scheintot, wieder |

| lagerung d. Uterus<br>(Aetiologie?). | 2. Abteil.                           | abgeflossen.                              | der Assistenz nicht ge-<br>nügend angezogen, wes-<br>halb noch Arm zu lösen.                                                                                                                                                                                                | mässig.                                                   | vitalisirt.                                                                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 28. Frau H., 32 Jahre<br>alt.        | III<br>para                          | —                                         | Rechter Arm und Nabel-<br>schnur vorgefallen. Um-<br>drehung gelingt schwer,<br>da Uterus fest contra-<br>hirt. Extraction.                                                                                                                                                 | —                                                         | Leicht schein-<br>tot, wieder<br>in's Leben<br>zurückgebr.                  |
| 29. Frau K. 23 Jahre<br>alt.         | I. Schulter-<br>lage.<br>2. Abteil.  | Frühzeitiger<br>Abfluss.                  | Bereits 4 vergebliche<br>Wendungsversuche ge-<br>macht. Arm stark an-<br>geschwollen. Wendung<br>mit rechter Hand ge-<br>lingt.                                                                                                                                             | Foetalspuls<br>gut.<br>schwach,<br>sehr un-<br>regelmäss. | Kind tot.                                                                   |
| 30. Frau Sch., 41 Jahre<br>alt.      | II. Schul-<br>terlage.<br>1. Abteil. | Frühzeitiger<br>Abfluss.                  | 8 Stunden nach Abfluss<br>des Wassers traf der<br>Arzt ein. Uterus stark<br>contrahirt. Vorsichtige<br>Wendung. Extraction.<br>Der vorgefallene rechte<br>Arm hatte sich in den<br>Nacken geschlagen, weil<br>die Schlinge zu lose<br>gehalten war. Schwie-<br>rige Lösung. | Foetalspuls<br>normal.<br>nicht<br>hörbar.                | Kind tot.                                                                   |
| 31. Frau Schm., 36<br>Jahre alt.     | II. Schul-<br>terlage.<br>1. Abteil. | Bei handteller-<br>grossen<br>Muttermund. | Rechter Arm und Nabel-<br>schnur waren vorge-<br>fallen. Vor 3 Stunden<br>Wasserabfluss. Uterus<br>fest contrahirt. Ex-<br>traction.                                                                                                                                        | —                                                         | Tief asphyk-<br>tisches Kind.<br>Wieder-<br>belebungsver-<br>suche vergebl. |

### III. Wendung.

| Nummer. | Körper- und Beckenverhältnisse.                                                                         | Wie viel Gebärend. | Lage der Frucht.             | Bei wie grossem Muttermunde floss das Wasser ab? | Besondere Umstände.                                                         | Zustand des Kindes vor und während der Operation. | Erfolg             |                                  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
|         |                                                                                                         |                    |                              |                                                  |                                                                             |                                                   | a. für die Mutter. | b. für das Kind.                 |
| 32.     | Frau Sch., 28 Jahre alt.                                                                                | V para             | I. Schulterlage, 1. Abteil.  | Wasserabfluss schleichend.                       | Nabelschnur, rechter Arm und rechter Fuss vorgefallen. Extraction.          | Nabelschnur pulslos.                              | normal.            | tot.                             |
| 33.     | Frau G., 30 Jahre alt.                                                                                  | V para             | I. Schulterlage, 2. Abteil.  | Vorzeitiger Abfluss.                             | Nabelschnur und linker Arm vorgefallen. Extraction.                         | Nabelschnur unregelmässig, pulsierend             | günstig.           | Tief scheintot, wieder belebt.   |
| 34.     | Frau K., 39 Jahre alt. Hydramnion.                                                                      | XVI para           | I. Schulterlage, 2. Abteil.  | Fruchtwasser vor 6 Stunden abgeflossen.          | Wendung.                                                                    | Foetalpuls regelmässig.                           | —                  | Leicht scheintot, wieder belebt. |
| 35.     | Frau S., 32 Jahre alt. Enges Beck. Conj. diag. 10 1/2. Frühere Geburt schwer, Einmal Kunstthülfe nötig. | VIII para          | II. Schulterlage, 2. Abteil. | Vor 6 Stunden.                                   | Linke Hand vorgefallen. Uterus stark contrahiert. Umdrehung deshalb schwer. | —                                                 | gut.               | ?                                |
| 36.     | Frau H., 32 Jahre alt.                                                                                  | IV para            | I. Schulterlage, 2. Abteil.  | Vor 3 Stunden.                                   | Rechte Hand war vorgefallen. Wendung.                                       | Foetalpuls regelmässig.                           | günstig.           | Lebensfrisch.                    |

|                                  |              |                                           |                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                   |          |                              |
|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|------------------------------|
| 37. Frau W.,<br>46 Jahre alt.    | XIII<br>para | I. Schulter-<br>lage, 1. Ab-<br>theilung. | Bei<br>verstrichenem<br>Muttermund.                                      | Rechte Hand vorgefallen.<br>Die wegen des unregel-<br>mässigen Foetalpulses<br>versuchte Extraction ist<br>fruchtlos wegen der<br>Grösse des Kindes. | Foetalpuls<br>wird<br>unregel-<br>mässig.         | normal.  | tot.                         |
| 38. Frau Sch.,<br>29 Jahre alt.  | IV<br>para   | II. Schul-<br>terlage,<br>1. Abteil.      | Vor $\frac{1}{2}$ Stunde<br>Abfluss.                                     | Wahrscheinlich aus ab-<br>gewichener Steisslage<br>entstanden. Austreibung<br>der Natur überlassen.                                                  | —                                                 | gut.     | lebt.                        |
| 39. Frau T.,<br>28 Jahre alt.    | III<br>para  | I. Schulter-<br>lage, 1. Ab-<br>theilung. | 14 Stunden<br>vor Ankniff<br>des Arztes.                                 | Wendung.                                                                                                                                             | —                                                 | normal.  | stark ent-<br>wickelt. Lebt. |
| 40. Frau P.,<br>34 Jahre alt.    | VIII<br>para | —                                         | —                                                                        | Wendung.                                                                                                                                             | —                                                 | günstig. | tot.                         |
| 41. Frau Sch.,<br>43 Jahre alt.  | IX<br>para   | I. Schulter-<br>lage,<br>1. Abteil.       | Künstlicher<br>Blasensprung<br>bei handteller-<br>grossem<br>Muttermund. | Placenta praevia.<br>Blutungen.                                                                                                                      | Früh-<br>geburt im<br>8. Monat.                   | normal.  | tot.                         |
| 42. Frau Schm.,<br>28 Jahre alt. | IV<br>para   | ?                                         | —                                                                        | Wendung.                                                                                                                                             | —                                                 | —        | ?                            |
| 43. Frau G.,<br>40 Jahre alt.    | VII<br>para  | I. Schulter-<br>lage,<br>1. Abteil.       | verstrichen.                                                             | Nabelschnur vorgefallen.                                                                                                                             | Vor-<br>gefallene<br>Nabel-<br>schnur<br>pulslos. | normal.  | tot.                         |
| 44. Frau H.,<br>33 Jahre alt.    | III<br>para  | II. Schul-<br>terlage,<br>1. Abteil.      | verstrichen.                                                             | Zwillinge. Erstes Kind<br>in Fusslage.                                                                                                               | —                                                 | normal.  | Beide gesund.                |

## III. Wendung.

| Nummer. | Körper- und Beckenverhältnisse.               | Wie viel Gebärend. | Lage der Frucht.                | Bei wie grossem Muttermunde floss das Wasser ab? | Besondere Umstände.                                       | Zustand des Kindes vor und während der Operation. | Erfolg<br>a. für die Mutter.<br>b. für das Kind              |
|---------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 45.     | Frau L., 38 Jahre alt.                        | IX para            | I. Schulterlage.<br>1. Abteil.  | verstrichen.                                     | Zwillinge. Erstes Kind in I. Schädellage.                 | —                                                 | gut. Beide gesund.                                           |
| 46.     | Frau St., 34 Jahre alt.                       | II para            | —                               | —                                                | —                                                         | —                                                 | —                                                            |
| 47.     | Frau Z., 39 Jahre alt.                        | IX para            | II. Schulterlage.<br>2. Abteil. | verstrichen.                                     | Zwillinge. Erstes Kind in II. Schädellage.                | gut.                                              | Die Wöchnerin starb an Ulcus ventriculi u. Nierenentzündung. |
| 48.     | Frau Sch., 27 Jahre alt.                      | VII para           | I. Schulterlage.<br>1. Abteil.  | verstrichen.                                     | Zwillinge. Erstes in II. Schädellage. Zweites Extraction. | normal.                                           | Beide gesund.                                                |
| 49.     | Frau K., 27 Jahre alt.                        | IV para            | —                               | —                                                | Nabelschnur vorgefallen. Extraction.                      | gut.                                              | lebt.                                                        |
| 50.     | Frau W., 44 Jahre alt. Starker Hängebauch.    | XII para           | II. Schulterlage.<br>2. Abteil. | 12 Stunden vor Ankunft des Arztes.               | Rechter Arm liegt vor.                                    | normal.                                           | lebt.                                                        |
| 51.     | Frau H., 35 J. alt. Enges Becken. Hydramnion. | X para             | II. Schulterlage.<br>1. Abteil. | verstrichen.                                     | Wendung. Extraction.                                      | günstig.                                          | gesund.                                                      |

|     |                                                                             |           |                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |                                    |                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 52. | Frau Oe., 37 Jahre alt. Alle früheren Geburten pathologisch. Meist Wendung. | XII para  | I. Schulterlage.<br>2. Abteil.  | frühzeitiger Abfluss.     | Zwillinge. Erstes Kind in I. Schädellage. Zweites verschleppte Querlage. Linker Arm vorgefallen. Starke Wehen. Uterus steinhart. Extraction.                                                                          | Vor-<br>gefallene<br>Nabel-<br>schnur<br>des<br>2. Kindes<br>pulslos. | gesund.                            | 1. Kind gesund. Beim 2. sind Wiederbelebungsversuche erfolglos. |
| 53. | Frau Sch., 50 Jahre alt.                                                    | V para    | I. Schulterlage.<br>1. Abteil.  | verstrichen.              | Zwillinge. I. in II. Schädellage. II. in Schulterlage.                                                                                                                                                                | —                                                                     | gesund.                            | lebt.                                                           |
| 54. | Frau T., 39 Jahre alt.                                                      | VIII para | II. Schulterlage.<br>2. Abteil. | —                         | Zwillinge. I. Steisslage. II. Schulterlage. Rechte Hand vorgefallen.                                                                                                                                                  | Allmähliches Verschwinden des Foetalpulses.                           | Geringe Nachblutung. Sonst gesund. | I. gesund. II. tot infolge der langen Dauer.                    |
| 55. | Frau H., 36 Jahre alt.                                                      | X para    | II. Schulterlage.<br>1. Abteil. | verstrichen.              | Zwillinge. I. Steisslage. II. Wendung. Extraction.                                                                                                                                                                    | —                                                                     | normal.                            | Beide gesund.                                                   |
| 56. | Frau K., 21 Jahre alt.                                                      | II para   | I. Schulterlage.<br>1. Abteil.  | handelteller-<br>gross.   | Wendung. Extraction.                                                                                                                                                                                                  | Früh-<br>geburt im<br>7. Monat.                                       | gesund.                            | tot.                                                            |
| 57. | Frau M., 40 Jahre alt.                                                      | XIII para | I. Schulterlage.<br>2. Abteil.  | Vorzeitiger Blasensprung. | 24 Stunden vor Ankunft des Arztes sprang Blase. Die linke Hand ist vorgefallen. Der Contractionsring steht fast in Nabelhöhe. Vorsichtige Wendung. Extraction. Der Rücken dreht sich im letzten Augenblick nach vorn. | —                                                                     | gesund.                            | lebt.                                                           |

## III. Wendung.

| Nummer.                    | Körper- und Beckenverhältnisse. | Wie viel Gebärend.              | Lage der Frucht.                            | Bei wie grossem Muttermunde floss das Wasser ab?                                                                            | Besondere Umstände.                       | Zustand des Kindes vor und während der Operation. | Erfolg             |                  |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|------------------|
|                            |                                 |                                 |                                             |                                                                                                                             |                                           |                                                   | a. für die Mutter. | b. für das Kind. |
| 58. Frau L., 23 Jahre alt. | IV para                         | I. Schulterlage.                | Fast verstrichen. Künstlicher Blasensprung. | Hervorgegangen aus II. Schädellage. Linker Arm vorgefallen. Extraction.                                                     | Foetalpuls regelmässig.                   | gesund.                                           | gesund.            | gesund.          |
| 59. Frau W., 27 Jahre alt. | VI para                         | II. Schulterlage. 1. Abteil.    | Vorzeitiger Blasensprung.                   | Nabelschnur und rechter Arm vorgefallen. Stark vernachlässigte Querlage. Rechte Schulter tief im Beckeneingang. Extraction. | Nabelschnur pulslos.                      | gesund.                                           | gesund.            | tot.             |
| 60. Frau G., 38 Jahre alt. | —                               | II. Schulterlage. 1. Abteil.    | Vorzeitiger Abfluss.                        | Arm und Nabelschnur vorgefallen. Extraction.                                                                                | Nabelschnur pulsiert schwach u. unregelm. | gesund.                                           | gesund.            | tot.             |
| 61. Frau M., 33 Jahre alt. | VIII para                       | I. Schulterlage. 1. Abtheilung. | verstrichen.                                | Zwillinge. I. Schädellage. II. Rechter Arm vorgefallen. Austreibung der Natur überlassen.                                   | —                                         | gesund.                                           | gesund.            | beide gesund.    |
| 62. Frau P., 42 Jahre alt. | IX para                         | I. Schulterlage. 2. Abtheilung. | Künstlicher Blasensprung.                   | Lagerung und Wendung durch äussere Handgriffe führten nicht zum Ziele. Arm liegt vor.                                       | Foetalpuls wird unregelmässig.            | gesund.                                           | gesund.            | tot.             |

|     |                                                                            |          |                                 |   |                                                                         |               |                          |                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 63. | Frau L., 45 Jahre alt.                                                     | XII para | I. Schulterlage. 1. Abtheilung. | — | Hervorgegangen aus I. Schädellage. Rechter Arm vorgefallen. Extraction. | —             | gesund.                  | Fractura humeri geheilt. |
| 64. | Frau F.                                                                    | X para   | II. Schulterlage. 1. Abteil.    | — | Zwillinge. Arm ist vorgefallen.                                         | Kind faultot. | gesund.                  | tot.                     |
| 65. | Frau H., 22 Jahre alt.                                                     | III para | I. Schulterlage. 1. Abteil.     | — | —                                                                       | —             | gesund.                  | lebt.                    |
| 66. | Marie M., 45 Jahre alt.                                                    | III para | I. Schulterlage. 1. Abteil.     | — | —                                                                       | —             | gesund.                  | gesund.                  |
| 67. | Frau D., 39 Jahre alt.                                                     | IX para  | I. Schulterlage. 2. Abteil.     | — | —                                                                       | —             | Mutter stirbt an Sepsis. | tot.                     |
| 68. | Frau R., 33 Jahre alt.                                                     | V para   | I. Schulterlage. 2. Abteil.     | — | Sehr kleines Kind.                                                      | —             | gesund.                  | lebt.                    |
| 69. | Frau K., 31 Jahre alt.                                                     | V para   | II. Schulterlage. 1. Abteil.    | — | —                                                                       | —             | gesund.                  | lebt.                    |
| 70. | Frau Oe., 29 Jahre alt. Bei der letzten Geburt auch Wendung u. Extraction. | VII para | I. Schulterlage. 1. Abteil.     | — | Der rechte Arm in den Nacken geschlagen. Fractur. Extraction.           | —             | gesund.                  | Fractura humeri geheilt. |
| 71. | Frau F., 31 Jahre alt.                                                     | III para | I. Schulterlage. 1. Abteil.     | — | Zwillinge. Armvorfall.                                                  | —             | gesund.                  | beide gesund.            |

## III. Wendung.

| Nummer. | Körper- und Beckenverhältnisse. | Wie viel Gebärend. | Lage der Frucht.                | Bei wie grossem Muttermund floss das Wasser ab? | Besondere Umstände.                                                                          | Zustand des Kindes vor und während der Operation. | Erfolg                   |                                    |
|---------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
|         |                                 |                    |                                 |                                                 |                                                                                              |                                                   | a.<br>für<br>die Mutter. | b.<br>für<br>das Kind.             |
| 72.     | Frau Qu., 33 Jahre alt.         | IV para            | I. Schulterlage.<br>2. Abteil.  | Vorzeitiger Abfluss.                            | 3 Stunden vor Ankunft des Arztes floss das Wasser ab. Wendung. Extraction.                   | —                                                 | gesund.                  | Leicht asphyktisch, wieder belebt. |
| 73.     | Frau F., 32 Jahre alt.          | V para             | I. Schulterlage.<br>2. Abteil.  | Bei handtellergrössem Muttermund.               | 4 Stunden vor Eintreffen des Arztes floss das Wasser ab. Starke Wehenthätigkeit. Extraction. | —                                                 | gesund.                  | tot.                               |
| 74.     | Frau A., 39 Jahre alt.          | XII para           | I. Schulterlage.<br>1. Abteil.  | —                                               | Nabelschnurvorfall.                                                                          | —                                                 | gesund.                  | gesund.                            |
| 75.     | Frau K., 38 Jahre alt.          | IX para            | II. Schulterlage.<br>2. Abteil. | —                                               | Zwillinge, Rechter Arm vorgefallen.                                                          | —                                                 | gesund.                  | gesund.                            |
| 76.     | Frau W., 36 Jahre alt.          | VIII para          | II. Schulterlage.<br>1. Abteil. | —                                               | —                                                                                            | —                                                 | gesund.                  | gesund.                            |
| 77.     | Frau K., 42 Jahre alt.          | IX para            | I. Schulterlage.<br>1. Abteil.  | —                                               | —                                                                                            | —                                                 | gesund.                  | gesund.                            |

|     |                                                 |                                                  |                                              |                                                                                                                                                                              |                              |                                                     |                                                                        |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 78. | Frau H., 30 Jahre alt. Becken nicht verengt.    | IV para<br>II. Schult-<br>terlage.<br>1. Abteil. | —                                            | Der rechte Arm vor-<br>fallen, stark geschwollen.<br>Contractionsring hoch.<br>Wendung auf beide<br>Füsse, weil an einem<br>keine Drehung erfolgt.<br>Kind stark entwickelt. | —                            | gesund.                                             | Tief asphyk-<br>tisch. Wieder-<br>belebungsver-<br>suche<br>erfolglos. |
| 79. | Frau K.                                         | VI para I. Schulter-<br>lage.<br>1. Abteil.      | Künstlicher<br>Blasensprung.                 | Beide Arme vorfallen.<br>Lagerung und äusserer<br>Handgriff vermochten<br>keine Correction her-<br>beizuführen.                                                              | —                            | gesund.                                             | gesund.                                                                |
| 80. | Frau B. Eages<br>Becken. Starker<br>Hängebauch. | VI para —                                        | —                                            | Extraction.                                                                                                                                                                  | —                            | gesund.                                             | gesund.                                                                |
| 81. | Auguste St. Lues<br>congenita.                  | III para I. Schulter-<br>lage.<br>1. Abteil.     | —                                            | Totfaules Kind aus dem<br>9. Monat.                                                                                                                                          | —                            | gesund.                                             | tot.                                                                   |
| 82. | Frau B., 31 Jahre<br>alt.                       | IV para I. Schulter-<br>lage.<br>2. Abteil.      | —                                            | —                                                                                                                                                                            | —                            | —                                                   | —                                                                      |
| 83. | Frau J., 33 Jahre<br>alt.                       | IV para I. Schulter-<br>lage.<br>2. Abteil.      | Vorzeitiger<br>Abfluss.                      | Nabelschnurvorfall. Ute-<br>rus stark contrahiert.                                                                                                                           | Nabel-<br>schnur<br>pulsirt. | Dammriss<br>(2 Suturen)<br>sonst gesund.<br>gesund. | lebt.                                                                  |
| 84. | Frau S., 37 Jahre<br>alt.                       | —<br>II. Schul-<br>terlage<br>1. Abteil.         | —                                            | Placenta praevia late-<br>ralis.                                                                                                                                             | —                            | gesund.                                             | gesund.                                                                |
| 85. | Frau J.                                         | III para I. Schulter-<br>lage.<br>2. Abteil.     | Bei fünfmark-<br>stückgrossen<br>Muttermund. | Fruchtwasser war schon<br>lange abgeflossen. Der<br>rechte Arm und Nabel-<br>schnur vorfallen. Ute-<br>rus stark contrahiert.<br>Extraction.                                 | —                            | gesund.                                             | wieder belebt.                                                         |

## III. Wendung.

| Nummer. | Körper- und Beckenverhältnisse. | Wie viel gebährend. | Lage der Frucht.                              | Bei wie grossem Muttermunde floss das Wasser ab? | Besondere Umstände.                                                                                                                                                                  | Zustand des Kindes vor und während der Operation. | Erfolg                |                     |
|---------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|         |                                 |                     |                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                      |                                                   | a.<br>für die Mutter. | b.<br>für das Kind. |
| 86.     | Frau St., 34 Jahre alt.         | IX para             | I. Schulterlage.                              | —                                                | —                                                                                                                                                                                    | —                                                 | gesund.               | gesund.             |
| 87.     | Frau L., 33 Jahre alt.          | VIII para           | I. Abteil.<br>II. Schulterlage.<br>2. Abteil. | —                                                | Wendung auf oberen Fuss.                                                                                                                                                             | —                                                 | gesund.               | gesund.             |
| 88.     | Frau W., 32 Jahre alt.          | IV para             | I. Schulterlage.<br>1. Abteil.                | —                                                | Armvorfall.                                                                                                                                                                          | —                                                 | gesund.               | gesund.             |
| 89.     | Frau B., 36 Jahre alt.          | —                   | I. Schulterlage.<br>2. Abteil.                | Bei 5-markstückgrossem Muttermunde.              | Fruchtwasser seit längerer Zeit abgeflossen. Der linke Arm und die Nabelschnur vorgefallen. Wendung auf beide Füße, da auf einen die Wendung nicht gelingt. Rechter Arm vorgefallen. | Die vorgefallene Nabelschnur pulsirt regelmäss.   | gesund.               | gesund.             |
| 90.     | Frau M., 36 Jahre alt.          | VI para             | I. Schulterlage. 1. Abt.                      | —                                                | —                                                                                                                                                                                    | —                                                 | gesund.               | gesund.             |
| 91.     | Frau St., 37 Jahre alt.         | X para              | I. Schulterlage.<br>1. Abteil.                | —                                                | —                                                                                                                                                                                    | —                                                 | gesund.               | gesund.             |
| 92.     | Frau H., 31 Jahre alt.          | VIII para           | —                                             | —                                                | Linker Arm und Nabelschnur vorgefallen.                                                                                                                                              | —                                                 | gesund.               | gesund.             |

## Operationen mit Aufopferung des kindlichen Lebens.

|                                                                     |              |                                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |         |      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|------|
| 1. Frau S.,<br>30 Jahre alt.                                        | VIII<br>para | I. Schulter-<br>lage.<br>1. Abteil. | Vorzeitiger<br>Abfluss.               | Placenta praevia. Der linke Arm liegt in der Vagina. Die Epidermis löst sich. Die Schulter steht tief im Beckeneingang. Der Uterus ist fest contrahirt. Eine schonende Wendung wird versucht, die Um-drehung gelingt nicht. Der Thorax wird mit scheerenförmig. Perforatorium eröffnet. Dar-nach erfolgt Geburt, conducticato corpore, mit Selbstwendung auf den Steiss im Beckenausgang. Uterusausspülung. | Der Die Frucht ist faul-tot, fast aus-getragen.                 | gesund. | tot. |
| 2. Frau W., 29 Jahre alt. Von den früheren Geburten zwei mit Zange. | —            | I. Schulter-<br>lage.<br>1. Abteil. | Bei ver-<br>strichenem<br>Muttermund. | Die Schief-lage ist her-vorgegangen aus abge-wichener 1. Kopf-lage mit Armvorfall. La-schnur gerung auf die linke Seite erfolglos. Die Nabelschnur fällt vor. Wendung. Das Kind stirbt langsam ab, weil Extraction bei d. Grösse des Kindes erfolglos ist. Perforation des nach-folgenden Kopfes.                                                                                                           | Das Pul-siren der Nabel-schnur wird all-mählich unregel-mässig. | gesund. | tot. |

## Operationen mit Aufopferung des kindlichen Lebens.

| Nummer. | Körper- und Beckenverhältnisse. | Wieviel gebärend. | Lage der Frucht.               | Bei wie grossem Muttermund floss das Wasser ab? | Besondere Umstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zustand des Kindes vor und während der Operation. | Erfolg                                |
|---------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
|         |                                 |                   |                                |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | a.<br>für die Mutter.                             | b.<br>für das Kind.                   |
| 3.      | Frau Z., 26 Jahre alt.          | III para          | I. Schulterlage.<br>1. Abteil. | —                                               | Vorfall beider Arme. Steissgeschwulst Wundung. Decapitatio. Uterusausspülung.                                                                                                                                                                                                                                   | Kind faul-<br>tot am<br>Ende des<br>8. Monats.    | gesund.<br><br>tot.                   |
| 4.      | Frau G. Verengte Conjugata.     | III para          | I. Schulterlage.<br>2. Abteil. | —                                               | Totaler Vaginalprolaps. Elongation des Cervix. Tetanus uteri. Der linke Arm ist vorgefallen. Wendung gelingt nicht. Exenterations-Versuch. Der Arm wird abgeschnitten, dann gelingt Wendung. Perforation d. Kopfes. Kephalotrib. Reposition des Prolapses gelingt, jedoch nicht Retention. Drainage des Uterus. | Das Kind ist stark an Pleuritis u. Peritonitis.   | Mutter stirbt<br>an Pleuritis<br>tot. |

|                                                                                |            |                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |         |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|
| 5. Johanna K.,<br>26 Jahre alt.<br>Spin. 26. Cr. 28.<br>Conj. extern.<br>19,5. | II<br>para | ver-<br>schleppte<br>Schulter-<br>lage. | —                                                                         | Die Kreissende meldet<br>sich erst 20 Stunden<br>nach Abfluss des Was-<br>sers. Decapitatio mit<br>Brauns Schlüsselhaken.<br>Extraction. Wendungs-<br>versuche, die mit Rück-<br>sicht auf das untere Ute-<br>rinsegment schonend<br>vorgenommen werden,<br>blieben erfolglos. Die<br>um die Schulter befind-<br>lichen Weichteile sind<br>stark angeschwollen. | — | gesund. | tot. |
| 6. Frau P.,<br>36 Jahre alt.                                                   | V<br>para  | II. Schul-<br>terlage.<br>1. Abteil.    | Bei<br>erweitertem<br>Muttermund<br>künstliches<br>Sprengen der<br>Blase. | Die Umdrehung gelingt<br>nicht, auch nicht bei<br>Wendung auf beide<br>Füsse. Es wird die<br>Diagnose auf Anence-<br>phalie gestellt und von<br>weiteren Wendungs-<br>versuchen abgesehen.<br>Cephalotrib u Schlinge<br>um den Hals. Stumpfer<br>Haken in die linke<br>Schulter, da die Schul-<br>terbreite sehr bedeutend<br>ist. Uterusausspülung.            | — | gesund. | tot. |

## V. Selbstentwicklung

| Nummer. | Körper- und Beckenverhältnisse.                               | Wie viel Gebärend. | Lage der Frucht.             | Bei wie grossem Muttermunde floss das Wasser ab? | Besondere Umstände.                                                                                                                          | Zustand des Kindes vor und während der Operation. | Erfolg             |                                |
|---------|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
|         |                                                               |                    |                              |                                                  |                                                                                                                                              |                                                   | a. für die Mutter. | b. für das Kind.               |
| 1.      | Auguste H., 20 Jahre alt. Spin. 26. Cr. 28. Conj. extern. 19. | —                  | II. Schulterlage, 1. Abteil. | —                                                | Hervorgegangen aus I. Schädellage. Rechter Arm fällt vor. Selbst-entwicklung.                                                                | I. totfaules Kind im 6. Mon.                      | gesund.            | tot.                           |
| 2.      | Berta S., 42 Jahre alt.                                       | V para             | I. Schulterlage, 1. Abteil.  | verstrichen.                                     | Nach Abfluss des Wassers stemmt sich die rechte Schulter gegen die Symphyse. Der Steiss kommt zuerst zum Durchschneiden. Exolutio spontanea. | Kind faul-tot, im 6. Monat.                       | gesund.            | —                              |
| 3.      | Frau B., 42 Jahre alt.                                        | VIII para          | —                            | verstrichen.                                     | Beim Blasenprung tritt der Steiss voran und plötzlich die ganze Frucht aus.                                                                  | Frucht im 8. Monat.                               | gesund.            | tot.                           |
| 4.      | Frau Sch., 36 Jahre alt. Hysterische Krämpfe.                 | VIII para          | I. Schulterlage.             | verstrichen.                                     | Zwillinge. Erstes Kind in Schädellage. Beim zweiten ist der linke Arm vorgefallen Geburt conductuato corpore.                                | —                                                 | gesund.            | erstes Kind lebt, zweites tot. |

|                               |             |                                     |              |                                                                                                                      |         |      |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 5. Minna S.,<br>23 Jahre alt. | III<br>para | II. Schul-<br>terlage.              | verstrichen. | Das Ei geht in toto mit faultot, in<br>den Eihäuten ab.                                                              | —       | —    |
| 6. Frau K.,<br>37 Jahre alt.  | IV<br>para  | —                                   | —            | Arm und Nabelschnur<br>vorgefallen. Neben der<br>Schulter tritt der Steiss<br>aus. Geburt condupli-<br>cato corpore. | gesund. | tot. |
| 7. Frau J.,<br>21 Jahre alt.  | II<br>para  | II. Schul-<br>terlage<br>i. Abteil. | verstrichen. | Evolutio spontanea. Die<br>Placenta ist fettig de-<br>generiert.                                                     | gesund. | —    |



## Lebenslauf.

---

Hermann Schultz, geboren am 15. November 1867 zu Demmin, Sohn des Königlichen Steuer-Inspektors Wilhelm Schultz, besuchte das Gymnasium seiner Vaterstadt Demmin, wo er Ostern 1887 das Zeugnis der Reife erhielt. Im Sommersemester 1887 bezog er die Universität Greifswald. Nach bestandenen tentamen physicum beendete er am 13. Juli 1892 das med. Staatsexamen und absolvirte am 7. August 1892 das Examen rigorosum zu Greifswald.

Während seiner Studienzeit besuchte er die Vorlesungen folgender Herren Professoren und Docenten:

Prof. Budge, Grawitz, Helferich, Heidenhain, Holtz, Geh. Rat Landois, Limpricht, Löffler, Möller, Geh. Rat Mosler, Prof. Oberbeck, Geh. Rat Pernice, Prof. Peiper, von Preuschen, Rinne, Schmitz, Geh. Rat. Schirmer, Prof. Schulz, Solger, Sommer, Strübing.

Allen diesen seinen hochverehrten Lehrern spricht derselbe seinen wärmsten Dank aus.

---

## Thesen.

---

### I.

Bei engem Becken ist nach ausgeführter Wendung die Extraction immer zu machen, und darf die Wirkung der Naturkräfte nicht abgewartet werden.

### II.

Hat bei Hernia incarcerata cruralis die Incarceration circa 48 Stunden bestanden, so ist die Herniotomie zu machen, nicht aber die Reposition.

### III.

Bei der Behandlung des Ileotyphus ist das Chinin in den meisten Fällen entbehrlich.

